

荒代かき

- ・代かきしすぎない
- ・播種まで中2日以内
- ・播種直前まで田面を露出させない

種子準備


- ・種子消毒
- ・鳩胸催芽1mm以内
- ・脱水
- ・乾かし過ぎない
- ・多めに準備

播種

- ・田面割合30-50%に均平なら70%
- ・ホッパーの蓋を少し開ける
- ・1m後ろから播く
- ・警報→速度調整
- ・ハローから横に泥流→速度落とす

播種順序 目印

1工程目に目印を立てる




巡回跡で走行位置を判断

- センター目印 (畦からハコ一幅×2.5m)、・ マーカー、
- ① 播種、● 空走、■ 播種後踏む、■ 空走

播種順序 空走

2工程空走してマーカ一付け



旋回跡で走行位置を判断

- センター目印(畦からハ口一
幅×2.5m)、・マーカ一、
①播種、①空走、■播種後
踏む、■空走

つまみ 1.9m幅

つまみ	播種量
2.0	4.3
2.2	4.8
2.4	5.3
2.6	5.8
2.8	6.3
3	6.8
3.2	7.3
3.4	7.8
3.6	8.3
3.8	8.8

つまみ	播種量
4.0	9.3
4.2	9.8
4.4	10.3
4.6	10.8
4.8	11.3
5	11.9
5.2	12.4
5.4	12.9
5.6	13.4
5.8	13.9

芽、根が伸びている
→0.1-0.2増やす

つまみ 2.1m幅

つまみ	播種量
2.0	3.9
2.2	4.3
2.4	4.8
2.6	5.2
2.8	5.7
3	6.2
3.2	6.6
3.4	7.1
3.6	7.5
3.8	8.0

つまみ	播種量
4.0	8.4
4.2	8.9
4.4	9.4
4.6	9.8
4.8	10.3
5	10.7
5.2	11.2
5.4	11.6
5.6	12.1
5.8	12.5

芽、根が伸びている
→0.1-0.2増やす

つまみ 2.3m幅

つまみ	播種量
2.0	3.5
2.2	4.0
2.4	4.4
2.6	4.8
2.8	5.2
3	5.6
3.2	6.0
3.4	6.5
3.6	6.9
3.8	7.3

つまみ	播種量
4.0	7.7
4.2	8.1
4.4	8.5
4.6	9.0
4.8	9.4
5	9.8
5.2	10.2
5.4	10.6
5.6	11.0
5.8	11.5

芽、根が伸びている
→0.1-0.2増やす

入水時期

- ・播種後5日から確認
スズメ食害→入水
- ・ひび→走水
- ・播種後10日から
出芽多→入水

一発剤

- ・マニュアルの除草剤
- ・播種後14日頃
- ・水口で10本採取
半分で1葉以上
→一発剤散布



←開く最初の葉
1葉、1cmない
ことも

1葉の稲



1.1葉



1葉



0.9葉